académie Strasbourg
direction des services départementaux de l'éducation nationale Bas-Rhin
éducation nationale

65, avenue de la Forêt-Noire
67083 STRASBOURG cedex

Téléphone 03.88.45.92.92
Télécopie 03.88.61.43.15

PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISE D'UN ELEVE ATTEINT D'UN HANDICAP OU D'UNE MALADIE CHRONIQUE

ELEVE **Année scolaire : 2017-2018**

NOM : BIEBER	Prénom : Grégoire
Date de naissance : 13.08.1998	Age : 19 ans
Domicile : 18 rue d'Ottwiller 67320 Drulingen	

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Adresse : Lycée du Haut-Barr SAVERNE	Téléphone : 03 88 71 22 11
Référents de l'école : Proviseur M.Buttner	
Classe fréquentée : TSTI2D	Régime scolaire : externe ☐ ½ pensionnaire ☒ interne ☐

REFERENTS DE L'ELEVE	Père	Mère	Autre Référent ou personne à prévenir
NOM	BIEBER	BIEBER	
Prénom	Raymond	Corinne	
Adresse	18 rue d'Ottwiller 67320 Drulingen	18 rue d'Ottwiller 67320 Drulingen	
Téléphone privé	03 88 00 07 69	03 88 00 07 69	
Téléphone portable	06 07 70 28 39	06 33 94 45 35	
Téléphone profes.	03 88 00 78 66		

INTERVENANTS EXTERIEURS

NOM	Fonction	Coordonnées
Dr.MOITRIER	Médecin traitant	03 88 71 87 21

I. RENSEIGNEMENTS SUR LA PATHOLOGIE

Grégoire présente une allergie alimentaire à l'arachide, noix de pécan et noix de macadamia.

II. AMENAGEMENTS DE LA SCOLARITE

1) Activités périscolaires : sorties, classes vertes, séjours à l'étranger…
Emporter la trousse d'urgence et mettre en place un régime d'éviction en concertation avec le service de santé scolaire.

2) Restauration :

Grégoire est autonome pour la composition de son repas.
Il doit éviter les aliments contenant de la cacahuète, de la noix, de la noix de pécan et noix de macadamia

V. PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Protocole d'urgence : ☒ Certificat d'EPS : ☐ Certificat médical : ☒
Ordonnance médicale : ☐ Autres pièces :

A……, le…….

L'élève : Référents de l'élève : Référents de l'établissement scolaire :

Service de Promotion de la Santé en Faveur des Elèves : Intervenants extérieurs :
Médecin scolaire :

Infirmière scolaire

Protocole de soins d'urgence (en cas d'allergie alimentaire)

Nom : BIEBER
Date de naissance : 13/08/1998
Classe :

Prénom : Grégoire
Poids : 59 kg
Etablissement :

Allergies : arachide (traces autorisées), noix, noix de Pécan, noix de Macadamia

Composition de la trousse d'urgence (noms commerciaux et/ou DCI) (déposée à l'école ou portée par l'enfant) :

- Antihistaminique : **KESTINLYO cp (ebastine)**
- Corticoïdes : **SOLUPRED comprimés orodispersibles 20 mg**
- Broncho-dilatateur : **VENTOLINE spray**
- Adrénaline **ANAPEN 0.30 mg**

Dès les premiers signes, après ingestion alimentaire
ALERTER LE SAMU (15 ou 112) et pratiquer :
DANS TOUS LES CAS : PREVENIR LES PARENTS

Situations	Signes d'appel	Conduite à tenir
Urticaire aiguë	Plaques rouges et démangeaisons	- Faire fondre sous la langue KESTINLYO 1cp et **SOLUPRED 3cp**
Angioedème	Gonflement des lèvres, du visage ou d'une partie du corps	- Faire fondre sous la langue KESTINLYO 1cp et **SOLUPRED 3cp**
Conjonctivite et/ou rhinite	Yeux rouges, gonflés Eternuements, écoulement du nez	- Faire fondre sous la langue KESTINLYO 1cp et **SOLUPRED 3cp**
Manifestations digestives associées	Douleurs abdominales, vomissements	- Faire fondre sous la langue KESTINLYO 1cp et **SOLUPRED 3cp**
Crise d'asthme	Toux sèche, gène respiratoire, difficulté à parler, sifflements	- Faire inhaler avec une chambre d'inhalation 3 bouffées de **VENTOLINE** -Si pas d'amélioration dans les 3 minutes faire à nouveau inhaler 3 bouffées de **VENTOLINE** - Si pas d'amélioration dans les 3 minutes : **VENTOLINE 3 bouffées et SOLUPRED 3 cp** - Si échec des sprays, avec aggravation ou d'emblée si signes d'asphyxie, injecter dans la face antérieure de la cuisse : **ANAPEN 0.30 mg et appel SAMU**
Œdème et signes respiratoires (œdème laryngé)	Toux rauque, voix modifiée, étouffement	Injecter dans la face antérieure de la cuisse : **ANAPEN 0.30 mg et appel SAMU**
Malaise avec signes d'appel	Fatigue inhabituelle, sensation de malaise avec une ou plusieurs manifestations allergiques (signes cutanés et/ou gène respiratoire et/ou troubles digestifs) voire perte de connaissance	- Coucher l'enfant et surélever ses jambes - ou si gène respiratoire, l'installer en position demi assise - Injecter dans la face antérieure de la cuisse : **ANAPEN 0.30 mg et appel SAMU**

Noter la date et l'heure des symptômes et des thérapeutiques administrées. Rester à côté de l'enfant ou de l'adolescent

Date : 25.05.2016 Signature et cachet du médecin allergologue : Dr CHAUVEAU

Docteur Amandine CHAUVEAU
Allergologie Pédiatrique