inspection académique
Bas-Rhin

65, avenue de la Forêt-Noire
67083 Strasbourg cedex

téléphone 03 88 45 92 92
télécopie . 03.88.61.43.15

PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISE D'UN ELEVE ATTEINT D'UN HANDICAP OU D'UNE MALADIE CHRONIQUE

ELEVE **Année scolaire : 2017/2018**

NOM : **BURCKEL**	*Prénom* : **Maxime**
Date de naissance : 7/05/2002	
Domicile : 73 rue du Général Leclerc 67440 MARMOUTIER	

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Adresse : Lycée Haut Barr Saverne	*Téléphone :* 03.88.71.22.11
Référents de l'école : Proviseur : M.Buttner	
Classe fréquentée : 2PRO	Régime scolaire : externe ☐ ½ pensionnaire ☒

REFERENTS DE L'ELEVE	Père	Mère	Autre Référent ou personne à prévenir
NOM		Mme BURCKEL	M. ROMENS
Adresse	73 rue du Général Leclerc 67440 MARMOUTIER		
Téléphone privé	03.88.70.80.82		03 88 70 67 81
Téléphone portable		06 36 88.41.34	
Téléphone profes.		03.88.71.64.00 Rayon crèmerie	

INTERVENANTS EXTERIEURS

NOM	Fonction	Coordonnées
Dr JOLIVET	Médecin Traitant	03 88 70 66 57

RENSEIGNEMENTS SUR LA PATHOLOGIE

Maxime présente une sensibilité importante à différents produits alimentaires : fruits à coque (arachide, noix de Pécan, pistache…), lupin ainsi qu'à la poussière et aux pollens. Le contact avec ces produits peut déclencher des réactions différentes isolées ou associées :

- ✓ **Réaction cutanée** : apparition de boutons ou plaques rouges avec ou sans démangeaisons ressemblant à la réaction d'une piqûre d'ortie.
- ✓ **Difficulté respiratoire** : l'enfant peut se plaindre de ne pouvoir respirer correctement, la respiration peut être bruyante avec sifflements audibles.
- ✓ **Gonflement** : il sera surtout visible au niveau du visage, les paupières et les lèvres sont boursouflées comme remplies d'eau. Le risque majeur est le gonflement de la gorge qui va entraver la respiration.

La maladie de Maxime mérite toute notre vigilance pour éviter tout contact avec l'un des produits sensibilisants, ce qui évite l'apparition de réactions allergiques.

AMENAGEMENTS DE LA SCOLARITE

1)Déplacements dans et hors de l'établissement scolaire : Pour tous les déplacements hors de l'école, emporter la trousse d'urgence.

2)Matériel spécifique nécessaire :

La trousse d'urgence contient : AERIUS, VENTOLINE,SOLUPRED orodispersible 20 mg, ANAPEN

3)Education physique et sportive : pas de contre-indication à la pratique d'une activité physique. Penser à emporter la tousse d'urgence pour les activités se déroulant à l'extérieur de l'école
Maxime est susceptible d'utiliser la Ventoline pour certaines activités physiques.

4)Activités périscolaires : sorties, classes vertes, séjours à l'étranger…

Pas de restriction pour les sorties d'une journée avec repas tiré du sac, penser à la trousse d'urgence.

5)Restauration : Maxime mangera à la cantine sans régime particulier, il gère seul ses évictions alimentaires.

A Saverne le 11.09.2017

Médecin scolaire : Parents de l'élève : Proviseur : M.Buttner
Dr OTTMANN

Infirmière scolaire :
Mme Wierel Véronique

PROTOCOLE D'INTERVENTION POUR UNE SITUATION D'URGENCE

Nom de l'élève : **BURCKEL Maxime**

1. **APPARITION DE BOUTONS OU PLAQUES ROUGES** (crise d'urticaire)

- ❖ Donner AERIUS : 1 cp ;
- ❖ Surveiller et Informer les parents pour suite à donner ;

2. DIFFICULTE A RESPIRER (crise d'asthme aiguë) :

- ❖ Faire inhaler VENTOLINE spray : 2 bouffées
- ❖ Si pas d'amélioration après 10 minutes : redonner 2 bouffées de VENTOLINE
- ❖ Si pas d'amélioration après 20 minutes : redonner 2 bouffées de VENTOLINE
  + alerter les secours médicalisés : médecin traitant si rapidement joignable ou faire le 15 (SAMU).

3. GONFLEMENT ET PICOTEMENTS DES LEVRES

- Donner - AERIUS 1 cp
  - SOLUPRED 20 mg 2 cps à laisser fondre sous la langue
- **Appeler le 15** pour demander un avis sur la suite à donner en signalant qu'il s'agit d'un enfant hautement allergique
- Surveiller et informer les parents

4. GONFLEMENT (œdème de Quincke) : *il sera surtout visible au niveau du visage, les paupières et les lèvres sont boursouflées comme remplies d'eau, l'enfant a la voix rauque ou présente des difficultés à respirer.*


- ❖ Donner1 cp AERIUS + 2 cps de SOLUPRED20mg
- ❖ Alerter immédiatement les secours médicalisés : le SAMU au 15 en précisant qu'il s'agit d'un enfant très allergique
- ❖ En fonction des informations données par le 15, faire une injection d'adrénaline ANAPEN dans la face antérieure et latérale de la cuisse ;

5. MALAISE GENERAL AVEC OU SANS PERTE DE CONNAISSANCE (choc anaphylactique): *l'enfant dit qu'il ne se sent pas bien, il paraît bizarre, ne réagit plus comme avant, semble somnolent, peut être associé à des signes digestifs comme des picotements de la bouche ou de la langue, un besoin urgent d'aller à la selle avec picotements des fesses ; ces signes peuvent évoluer rapidement (en qqs minutes) vers la perte de connaissance.*

- ❖ Alerter les secours médicalisés : le SAMU au 15.
- ❖ Faire une injection d'adrénaline ANAPEN dans la face antérieure et latérale de la cuisse ;


ANAPEN : Mode d'emploi

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET LA MANIPULATION




Nettoyer la peau au lieu choisi pour l'injection avec un tampon alcoolisé, mais en cas de nécessité l'injection peut être faite au travers du tissu d'un vêtement léger.


1. Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille. Une légère résistance indique que l'enveloppe protectrice grise de l'aiguille a été retirée.




2. Enlever le bouchon noir de sécurité du bouton déclencheur rouge.



3. Maintenir l'extrémité de l'auto-injecteur qui contient l'aiguille par une pression ferme de celui-ci, suivant un axe perpendiculaire à la face antéro-latérale du muscle de la cuisse.



4. Déclencher l'administration automatique de la dose à injecter par simple pression du bouton déclencheur,



- Maintenir le dispositif dans cette position environ dix secondes.
- Procéder à un léger massage de la zone d'injection,
- Jeter le dispositif employé après avoir remis en place le capuchon protecteur de l'aiguille.
- Après injection, éviter tout effort au sujet et le maintenir allongé au chaud les jambes surélevées. L'amélioration doit apparaître dans les 3 à 5 minutes après l'injection qui selon les conseils de votre médecin, peut être répétée après 10 à 15 minutes si nécessaire.
- Cette injection faite en urgence doit être suivie d'une **consultation médicale** dans les plus brefs délais.

Après l'injection, il restera du liquide dans le dispositif.
Ne pas le réutiliser.